

KOLONOSKOPIA		
	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLCh PRAXIS W KOSZALINIE	Wydanie: 1 Data: 2018-05-28 Strona: 1 z 2

TERMIN BADANIA:.....

GODZINA BADANIA: 17.00

Kolonoskopia – wzniernikowanie jelita grubego

Szanowni Państwo, właściwe przygotowanie jelita grubego poprawia jakość badania i skraca jego czas. Badanie wykonywane jest przy użyciu giętkiego wzniernika (kolonoskopu), który wprowadza się przez odbył do jelita grubego.

Powikłania kolonoskopii zdarzają się niezwykle rzadko. Najpoważniejsze jak przedziurawienie ściany jelita (0,14-0,18%) czy krwawienie (0,008%) zwykle wymagają pilnej operacji. Uczucie wzdęcia i dyskomfortu ustępujące w ciągu kilku godzin nie jest traktowane jako powikłanie. W celu złagodzenia tych objawów zaleca się wizytę w toalecie (nie należy wstrzymywać gazów). Śladowa obecność krwi w stolcu, zwłaszcza, gdy pobierano wycinki nie jest zjawiskiem niepokojącym.

Dla komfortu i bezpieczeństwa Pacjenta badanie wykonywane jest przy współpracy z anestezjologiem (premedykacja, sedacja, znieczulenie). Z tego względu, po badaniu Pacjent przebywa w Lecznicy przez około 2 godziny; po tym czasie pod opieką osoby towarzyszącej może udać się do domu.

Obowiązuje 24-godzinny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz picia alkoholu. W bardzo rzadkich przypadkach może zaistnieć konieczność dłuższej obserwacji w oddziale szpitalnym.

Kolonoskopia diagnostyczna w 30% wykazuje potrzebę pobrania wycinków lub usunięcia polipa, co zostanie wykonane o ile Pacjent (przed badaniem) wyrazi zgodę. Wynik badania jest Państwa własnością: należy go starannie przechowywać i okazywać lekarzom w razie potrzeby. W przypadku pobrania wycinków lub usunięcia polipa uzupełnieniem badania jest wynik histopatologiczny, po który należy zgłosić się do Lecznicy w ustalonym terminie.

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

Schemat użycia preparatu MOVIPREP

3 dni przed badaniem należy zachować dietę płynną tzn. w ogóle nie jeść pokarmów o stałej konsystencji (chleba, mięsa, makaronów itp.) należy tylko pić płyny (soki płynne, jogurty i kefir, kisiel, herbata, kawa, woda), należy pamiętać, aby w płynach nie było ziaren owocowych.

KOLONOSKOPIA		
	SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLCh PRAXIS W KOSZALINIE	Wydanie: 1 Data: 2018-05-28 Strona: 2 z 2

W dniu badania nad ranem o godzinie 7.00-8.00 należy rozpuścić 1 porcję (2 saszetki: A i B) proszku **MOVIPREP** w jednym litrze wody i tak przygotowany 1 litr roztworu należy wypić w ciągu ok. 1 godziny (np. szklanka co 15 minut).

Po 1 porcji środka przeczyszczającego należy jeszcze dodatkowo wypić ok. 2 litrów wody niegazowanej.

Drugą porcję środka przeczyszczającego przygotowaną tak samo j/w, należy wypić między godziną 12.00-13.00.

UWAGA! Po drugiej porcji preparatu **nie wypijamy** dodatkowych 2 litrów wody.

Po takim przygotowaniu w wyznaczonym dniu i określonej godzinie należy zgłosić się do Ambulatorium Prywatnej Lecznicy Chirurgicznej „PRAXIS” w Koszalinie, Al. Armii Krajowej 7.

Należy przynieść ze sobą:

- dokumentację potrzebną przy badaniu (np. wyniki poprzednich kolonoskopii, w tym hist.-pat)
- wypełnioną i podpisaną informację o przebiegu badania, która jest jednocześnie zgodą na jego wykonanie, pacjent otrzymuje ją jednocześnie z niniejszą instrukcją.

UWAGA!

Jeśli pacjent przyjmuje leki działające na układ krążenia (np. na nadciśnienie, na serce) – w dniu badania należy je przyjąć podobnie jak każdego dnia popijając małą ilością wody, dotyczy to też leków neurologicznych (np. przeciwpadaczkowych).

Doustne leki przeciwcukrzycowe można odstawić na dwa dni diety płynnej i dzień badania.

O inne szczegóły dotyczące leków należy pytać lekarza, który kieruje na kolonoskopię.

UWAGA!

W dniu badania należy zgłosić się z osobą towarzyszącą, oraz NIE WOLNO! po badaniu prowadzić pojazdów mechanicznych.

PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ PIŻAMY I KAPCI.

PRYWATNA LECZNICA CHIRURGICZNA PRAXIS sp. z o.o.

AL. ARMII KRAJOWEJ 7, 75-200 KOSZALIN

603 990 401 LUB 94 346 14 01

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek od 14:00-19:00

Czwartek od 10:00-16:00